

Cholesterol totaal

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

HDL-cholesterol

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

LDL-cholesterol

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

Triglyceriden

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

Cholesterol/HDL-ratio

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

LDL/HDL-risico-index

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.