

Estradiol

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij de overgang, verminderde eierstokfunctie, laag lichaamsgewicht, intensief sporten, hypofyseproblemen of bepaalde hormonale medicijnen.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. De waarde wisselt met leeftijd, cyclusfase, zwangerschap en hormoongebruik en moet daarom in die context worden beoordeeld.

LH

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde aansturing door hypothalamus of hypofyse, laag gewicht, intensief sporten, ernstige ziekte, zwangerschap of gebruik van hormonen.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. De betekenis hangt af van leeftijd, geslacht, cyclusfase en eventueel hormoongebruik.

FSH

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde aansturing vanuit hypothalamus of hypofyse, laag gewicht, intensief sporten, ernstige ziekte, zwangerschap of gebruik van hormonen.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. De betekenis hangt af van leeftijd, geslacht, cyclusfase en eventueel hormoongebruik.

Prolactine

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde is meestal niet zorgwekkend, maar kan passen bij verminderde hypofysefunctie, gebruik van dopaminebevorderende medicijnen of onvoldoende melkproductie na een bevalling.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. Stress, slaap, zwangerschap en medicatie kunnen de waarde beïnvloeden. Een verhoogde uitslag wordt daarom vaak gecontroleerd.

Testosteron

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde werking van zaadballen of eierstokken, hypofyseproblemen, overgewicht, chronische ziekte, slaaptekort, bepaalde medicijnen of hogere leeftijd.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. De uitslag hangt af van tijdstip, leeftijd, geslacht en SHBG. Bij mannen heeft afname in de ochtend meestal de voorkeur.

TSH

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied dat past bij leeftijd, geslacht, afnametijdstip en - waar relevant - cyclusfase.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij een te snel werkende schildklier, te hoge dosering schildkliermedicatie, zwangerschap, hypofyseproblemen, ernstige ziekte of invloed van medicijnen.

Verhoogd: De waarde ligt boven het referentiegebied. Een afwijkende waarde wordt meestal samen met FT4 en soms FT3 beoordeeld.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.