

## **ASAT**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

## **ALAT**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

## **Gamma-GT**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

## **Alkalische fosfatase**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

## **Bilirubine totaal**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

## **Cholinesterase**

**Normaal:** De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

**Verlaagd:** Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

**Verhoogd:** Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

**Let op:** Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.