

Cholesterol

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

HDL

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

CK

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet zorgwekkend; de betekenis hangt af van de specifieke bepaling en andere risicofactoren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij een verhoogd cardiovasculair risico, spierbelasting of hartbelasting, afhankelijk van de bepaling en klinische situatie.

Gamma-GT

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde is vaak niet afwijkend, maar kan afhankelijk van de bepaling passen bij verminderde aanmaak, voedingstoestand of medicatie.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij belasting of beschadiging van levercellen, galwegproblemen, alcohol, medicatie of spierinvloed, afhankelijk van de bepaling.

Urinezuur

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan samenhangen met voeding, vochtbalans, spiermassa, medicatie of een veranderde verwerking of uitscheiding.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verminderde nierfunctie, vochttekort, verhoogde aanvoer of een verstoring van de elektrolytenbalans.

Creatinine

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan samenhangen met voeding, vochtbalans, spiermassa, medicatie of een veranderde verwerking of uitscheiding.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verminderde nierfunctie, vochttekort, verhoogde aanvoer of een verstoring van de elektrolytenbalans.

Glucose

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.