

Bloedbeeld Basis

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde aanmaak, een tekort aan bouwstoffen, bloedverlies, verhoogde afbraak of invloed van ziekte of medicatie.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde aanmaak, vochttekort, ontsteking, infectie of een andere verandering in het bloed of beenmerg.

Leukocytendifferentiatie

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Neutrofielen

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Lymfocyten

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Eosinofielen

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Basofielen

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Monocyten

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Staafkernige granulocyten

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.