

Bloedbeeld

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde aanmaak, een tekort aan bouwstoffen, bloedverlies, verhoogde afbraak of invloed van ziekte of medicatie.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde aanmaak, vochttekort, ontsteking, infectie of een andere verandering in het bloed of beenmerg.

Ferritine

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij onvoldoende inname, verminderde opname, verhoogde behoefte, verlies of een verandering in verwerking door lever of nieren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij supplementgebruik, verminderde uitscheiding, ontsteking, leverbelasting of een te hoge inname; de betekenis verschilt per stof.

Ijzer

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij onvoldoende inname, verminderde opname, verhoogde behoefte, verlies of een verandering in verwerking door lever of nieren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij supplementgebruik, verminderde uitscheiding, ontsteking, leverbelasting of een te hoge inname; de betekenis verschilt per stof.

Vitamine B12

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij onvoldoende inname, verminderde opname, verhoogde behoefte, verlies of een verandering in verwerking door lever of nieren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij supplementgebruik, verminderde uitscheiding, ontsteking, leverbelasting of een te hoge inname; de betekenis verschilt per stof.

Vitamine D

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij onvoldoende inname, verminderde opname, verhoogde behoefte, verlies of een verandering in verwerking door lever of nieren.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij supplementgebruik, verminderde uitscheiding, ontsteking, leverbelasting of een te hoge inname; de betekenis verschilt per stof.

TSH

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde productie of aansturing, medicatie, ziekte, leeftijd of het tijdstip van afname.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde productie, veranderde terugkoppeling, medicatie, zwangerschap of het tijdstip van afname.

Vrij T4

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde productie of aansturing, medicatie, ziekte, leeftijd of het tijdstip van afname.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde productie, veranderde terugkoppeling, medicatie, zwangerschap of het tijdstip van afname.

Glucose

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.